

Plodina, indikace	Dávkování	Aplikace	Měsí(e)
Balkonové rostliny, Mšice - Při prvním výskytu mšic. Účinný také na svlušky, štítenky a puklice. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	12-18 ml / 6 l / 100 m ²	Postřik	5,6, 7,8, 9
Balkonové rostliny, Puklice - Při prvním výskytu puklic. Účinný také na mšice, svlušky a štítenky. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	12-18 ml / 6 l / 100 m ²	Postřik	5,6, 7,8, 9
Balkonové rostliny, Svlušky - Při prvním výskytu svlušek. Účinný také na mšice, štítenky a puklice. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	12-18 ml / 6 l / 100 m ²	Postřik	5,6, 7,8, 9
Balkonové rostliny, Štítenky - Při prvním výskytu štítenek. Účinný také na mšice, svlušky a puklice. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	12-18 ml / 6 l / 100 m ²	Postřik	5,6, 7,8, 9
Brukvovitá zelenina, Puklice - Při prvním výskytu puklic. Účinný také na mšice, svlušky a štítenky. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	6-12 ml / 6 l / 100 m ²	Postřik	5,6, 7,8, 9
Brukvovitá zelenina, Svlušky - Při prvním výskytu svlušek. Účinný také na mšice, štítenky a puklice. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	6-12 ml / 6 l / 100 m ²	Postřik	5,6, 7,8, 9
Brukvovitá zelenina, Štítenky - Při prvním výskytu štítenek. Účinný také na mšice, svlušky a puklice. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	6-12 ml / 6 l / 100 m ²	Postřik	5,6, 7,8, 9
Celer, Mšice - Při prvním výskytu mšic. Účinný také na svlušky, štítenky a puklice. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	6-12 ml / 6 l / 100 m ²	Postřik	5,6, 7,8, 9
Brukvovitá zelenina, Mšice - Při prvním výskytu mšic. Účinný také na svlušky, štítenky a puklice. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	6-12 ml / 6 l / 100 m ²	Postřik	5,6, 7,8, 9
Cuketa, Mšice - Při prvním výskytu mšic. Účinný také na svlušky, štítenky a puklice. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	6-12 ml / 6 l / 100 m ²	Postřik	5,6, 7,8, 9
Orchidej, Mšice - Při prvním výskytu mšic. Účinný také na svlušky, štítenky a puklice. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	12-18 ml / 6 l / 100 m ²	Postřik	5,6, 7,8, 9
Orchidej, Puklice - Při prvním výskytu puklic. Účinný také na mšice, svlušky a štítenky. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	12-18 ml / 6 l / 100 m ²	Postřik	5,6, 7,8, 9
Orchidej, Svlušky - Při prvním výskytu svlušek. Účinný také na mšice, štítenky a puklice. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	12-18 ml / 6 l / 100 m ²	Postřik	5,6, 7,8, 9

Orchidej, Štítenky - Při prvním výskytu štítenek. Účinný také na mšice, svlušky a puklice. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	12-18 ml / 6 l / 100 m ²	Postřik	5,6, 7,8, 9
Rajčata, Svlušky - Při prvním výskytu svlušek. Účinný také na mšice, štítenky a puklice. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	6-12 ml / 6 l / 100 m ²	Postřik	5,6, 7,8, 9
Rajčata, Štítenky - Při prvním výskytu štítenek. Účinný také na mšice, svlušky a puklice. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	6-12 ml / 6 l / 100 m ²	Postřik	5,6, 7,8, 9
Růže, Mšice - Při prvním výskytu mšic. Účinný také na svlušky, štítenky a puklice. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	12-18 ml / 6 l / 100 m ²	Postřik	5,6, 7,8, 9
Růže, Puklice - Při prvním výskytu puklic. Účinný také na mšice, svlušky a štítenky. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	12-18 ml / 6 l / 100 m ²	Postřik	5,6, 7,8, 9
Celer, Puklice - Při prvním výskytu puklic. Účinný také na mšice, svlušky a štítenky. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	6-12 ml / 6 l / 100 m ²	Postřik	5,6, 7,8, 9
Celer, Svlušky - Při prvním výskytu svlušek. Účinný také na mšice, štítenky a puklice. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	6-12 ml / 6 l / 100 m ²	Postřik	5,6, 7,8, 9
Celer, Štítenky - Při prvním výskytu štítenek. Účinný také na mšice, svlušky a puklice. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	6-12 ml / 6 l / 100 m ²	Postřik	5,6, 7,8, 9
Cibule, Mšice - Při prvním výskytu mšic. Účinný také na svlušky, štítenky a puklice. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	6-12 ml / 6 l / 100 m ²	Postřik	5,6, 7,8, 9
Cibule, Puklice - Při prvním výskytu puklic. Účinný také na mšice, svlušky a štítenky. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	6-12 ml / 6 l / 100 m ²	Postřik	5,6, 7,8, 9
Cibule, Svlušky - Při prvním výskytu svlušek. Účinný také na mšice, štítenky a puklice. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	6-12 ml / 6 l / 100 m ²	Postřik	5,6, 7,8, 9
Cibule, Štítenky - Při prvním výskytu štítenek. Účinný také na mšice, svlušky a puklice. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	6-12 ml / 6 l / 100 m ²	Postřik	5,6, 7,8, 9
Cuketa, Puklice - Při prvním výskytu puklic. Účinný také na mšice, svlušky a štítenky. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	6-12 ml / 6 l / 100 m ²	Postřik	5,6, 7,8, 9
Cuketa, Svlušky - Při prvním výskytu svlušek. Účinný také na mšice, štítenky a puklice. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	6-12 ml / 6 l / 100 m ²	Postřik	5,6, 7,8, 9

Košťálová zelenina, Puklice - Při prvním výskytu puklic. Účinný také na mšice, svilušky a štítenky. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	6-12 ml / 6 l / 100 m ²	Postřik	5,6, 7,8, 9
Košťálová zelenina, Svilušky - Při prvním výskytu svilušek. Účinný také na mšice, štítenky a puklice. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	6-12 ml / 6 l / 100 m ²	Postřik	5,6, 7,8, 9
Košťálová zelenina, Štítenky - Při prvním výskytu štítenek. Účinný také na mšice, svilušky a puklice. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	6-12 ml / 6 l / 100 m ²	Postřik	5,6, 7,8, 9
Květák, Mšice - Při prvním výskytu mšic. Účinný také na svilušky, štítenky a puklice. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	6-12 ml / 6 l / 100 m ²	Postřik	5,6, 7,8, 9
Květák, Puklice - Při prvním výskytu puklic. Účinný také na mšice, svilušky a štítenky. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	6-12 ml / 6 l / 100 m ²	Postřik	5,6, 7,8, 9
Květák, Svilušky - Při prvním výskytu svilušek. Účinný také na mšice, štítenky a puklice. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	6-12 ml / 6 l / 100 m ²	Postřik	5,6, 7,8, 9
Květák, Štítenky - Při prvním výskytu štítenek. Účinný také na mšice, svilušky a puklice. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	6-12 ml / 6 l / 100 m ²	Postřik	5,6, 7,8, 9
Listová zelenina, Mšice - Při prvním výskytu mšic. Účinný také na svilušky, štítenky a puklice. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	6-12 ml / 6 l / 100 m ²	Postřik	5,6, 7,8, 9
Listová zelenina, Puklice - Při prvním výskytu puklic. Účinný také na mšice, svilušky a štítenky. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	6-12 ml / 6 l / 100 m ²	Postřik	5,6, 7,8, 9
Listová zelenina, Svilušky - Při prvním výskytu svilušek. Účinný také na mšice, štítenky a puklice. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	6-12 ml / 6 l / 100 m ²	Postřik	5,6, 7,8, 9
Listová zelenina, Štítenky - Při prvním výskytu štítenek. Účinný také na mšice, svilušky a puklice. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	6-12 ml / 6 l / 100 m ²	Postřik	5,6, 7,8, 9
Malina, Mšice - Při prvním výskytu mšic. Účinný také na svilušky, štítenky a puklice. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	20-30 ml / 10 l	Postřik	3,4, 5,6, 7
Malina, Puklice - Při prvním výskytu puklic. Účinný také na mšice, svilušky a štítenky. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	20-30 ml / 10 l	Postřik	3,4, 5,6, 7
Malina, Svilušky - Při prvním výskytu svilušek. Účinný také na mšice, štítenky a puklice. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	20-30 ml / 10 l	Postřik	3,4, 5,6, 7
Malina, Štítenky - Při prvním výskytu štítenek. Účinný také na mšice, svilušky a puklice. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	20-30 ml / 10 l	Postřik	3,4, 5,6, 7

Okrasné rostliny, Mšice - Při prvním výskytu mšic. Účinný také na svilušky, štítenky a puklice. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	12-18 ml / 6 l / 100 m ²	Postřik	5,6, 7,8, 9
Mrkev, Mšice - Při prvním výskytu mšic. Účinný také na svilušky, štítenky a puklice. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	6-12 ml / 6 l / 100 m ²	Postřik	5,6, 7,8, 9
Mrkev, Puklice - Při prvním výskytu puklic. Účinný také na mšice, svilušky a štítenky. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	6-12 ml / 6 l / 100 m ²	Postřik	5,6, 7,8, 9
Mrkev, Svilušky - Při prvním výskytu svilušek. Účinný také na mšice, štítenky a puklice. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	6-12 ml / 6 l / 100 m ²	Postřik	5,6, 7,8, 9
Mrkev, Štítenky - Při prvním výskytu štítenek. Účinný také na mšice, svilušky a puklice. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	6-12 ml / 6 l / 100 m ²	Postřik	5,6, 7,8, 9
Okrasné rostliny, Puklice - Při prvním výskytu puklic. Účinný také na mšice, svilušky a štítenky. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	12-18 ml / 6 l / 100 m ²	Postřik	5,6, 7,8, 9
Okrasné rostliny, Svilušky - Při prvním výskytu svilušek. Účinný také na mšice, štítenky a puklice. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	12-18 ml / 6 l / 100 m ²	Postřik	5,6, 7,8, 9
Okrasné rostliny, Štítenky - Při prvním výskytu štítenek. Účinný také na mšice, svilušky a puklice. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	12-18 ml / 6 l / 100 m ²	Postřik	5,6, 7,8, 9
Okurka, Mšice - Při prvním výskytu mšic. Účinný také na svilušky, štítenky a puklice. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	6-12 ml / 6 l / 100 m ²	Postřik	5,6, 7,8, 9
Okurka, Puklice - Při prvním výskytu puklic. Účinný také na mšice, svilušky a štítenky. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	6-12 ml / 6 l / 100 m ²	Postřik	5,6, 7,8, 9
Okurka, Svilušky - Při prvním výskytu svilušek. Účinný také na mšice, štítenky a puklice. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	6-12 ml / 6 l / 100 m ²	Postřik	5,6, 7,8, 9
Okurka, Štítenky - Při prvním výskytu štítenek. Účinný také na mšice, svilušky a puklice. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	6-12 ml / 6 l / 100 m ²	Postřik	5,6, 7,8, 9
Petržel, Mšice - Při prvním výskytu mšic. Účinný také na svilušky, štítenky a puklice. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	6-12 ml / 6 l / 100 m ²	Postřik	5,6, 7,8, 9
Palma, Mšice - Při prvním výskytu mšic. Účinný také na svilušky, štítenky a puklice. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	12-18 ml / 6 l / 100 m ²	Postřik	5,6, 7,8, 9

Palma, Puklice - Při prvním výskytu puklic. Účinný také na mšice, svilušky a štítenky. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	12-18 ml / 6 l / 100 m ²	Postřik	5,6, 7,8, 9
Palma, Svilušky - Při prvním výskytu svilušek. Účinný také na mšice, štítenky a puklice. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	12-18 ml / 6 l / 100 m ²	Postřik	5,6, 7,8, 9
Palma, Štítenky - Při prvním výskytu štítenek. Účinný také na mšice, svilušky a puklice. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	12-18 ml / 6 l / 100 m ²	Postřik	5,6, 7,8, 9
Paprika, Mšice - Při prvním výskytu mšic. Účinný také na svilušky, štítenky a puklice. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	6-12 ml / 6 l / 100 m ²	Postřik	5,6, 7,8, 9
Paprika, Puklice - Při prvním výskytu puklic. Účinný také na mšice, svilušky a štítenky. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	6-12 ml / 6 l / 100 m ²	Postřik	5,6, 7,8, 9
Paprika, Svilušky - Při prvním výskytu svilušek. Účinný také na mšice, štítenky a puklice. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	6-12 ml / 6 l / 100 m ²	Postřik	5,6, 7,8, 9
Paprika, Štítenky - Při prvním výskytu štítenek. Účinný také na mšice, svilušky a puklice. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	6-12 ml / 6 l / 100 m ²	Postřik	5,6, 7,8, 9
Petržel, Puklice - Při prvním výskytu puklic. Účinný také na mšice, svilušky a štítenky. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	6-12 ml / 6 l / 100 m ²	Postřik	5,6, 7,8, 9
Petržel, Svilušky - Při prvním výskytu svilušek. Účinný také na mšice, štítenky a puklice. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	6-12 ml / 6 l / 100 m ²	Postřik	5,6, 7,8, 9
Petržel, Štítenky - Při prvním výskytu štítenek. Účinný také na mšice, svilušky a puklice. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	6-12 ml / 6 l / 100 m ²	Postřik	5,6, 7,8, 9
Plodová zelenina, Mšice - Při prvním výskytu mšic. Účinný také na svilušky, štítenky a puklice. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	6-12 ml / 6 l / 100 m ²	Postřik	5,6, 7,8, 9
Plodová zelenina, Puklice - Při prvním výskytu puklic. Účinný také na mšice, svilušky a štítenky. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	6-12 ml / 6 l / 100 m ²	Postřik	5,6, 7,8, 9
Plodová zelenina, Svilušky - Při prvním výskytu svilušek. Účinný také na mšice, štítenky a puklice. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	6-12 ml / 6 l / 100 m ²	Postřik	5,6, 7,8, 9
Plodová zelenina, Štítenky - Při prvním výskytu štítenek. Účinný také na mšice, svilušky a puklice. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	6-12 ml / 6 l / 100 m ²	Postřik	5,6, 7,8, 9

Pór, Mšice - Při prvním výskytu mšic. Účinný také na svilušky, štítenky a puklice. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	6-12 ml / 6 l / 100 m ²	Postři k	5,6, 7,8, 9
Pór, Puklice - Při prvním výskytu puklic. Účinný také na mšice, svilušky a štítenky. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	6-12 ml / 6 l / 100 m ²	Postři k	5,6, 7,8, 9
Pór, Svilušky - Při prvním výskytu svilušek. Účinný také na mšice, štítenky a puklice. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	6-12 ml / 6 l / 100 m ²	Postři k	5,6, 7,8, 9
Pór, Štítenky - Při prvním výskytu štítenek. Účinný také na mšice, svilušky a puklice. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	6-12 ml / 6 l / 100 m ²	Postři k	5,6, 7,8, 9
Rajčata, Mšice - Při prvním výskytu mšic. Účinný také na svilušky, štítenky a puklice. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	6-12 ml / 6 l / 100 m ²	Postři k	5,6, 7,8, 9
Rajčata, Puklice - Při prvním výskytu puklic. Účinný také na mšice, svilušky a štítenky. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	6-12 ml / 6 l / 100 m ²	Postři k	5,6, 7,8, 9
Růže, Svilušky - Při prvním výskytu svilušek. Účinný také na mšice, štítenky a puklice. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	12-18 ml / 6 l / 100 m ²	Postři k	5,6, 7,8, 9
Růže, Štítenky - Při prvním výskytu štítenek. Účinný také na mšice, svilušky a puklice. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	12-18 ml / 6 l / 100 m ²	Postři k	5,6, 7,8, 9
Rybíz, Mšice - Při prvním výskytu mšic. Účinný také na svilušky, štítenky a puklice. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	20-30 ml / 10 l	Postři k	3,4, 5,6, 7
Rybíz, Puklice - Při prvním výskytu puklic. Účinný také na mšice, svilušky a štítenky. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	20-30 ml / 10 l	Postři k	3,4, 5,6, 7
Rybíz, Svilušky - Při prvním výskytu svilušek. Účinný také na mšice, štítenky a puklice. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	20-30 ml / 10 l	Postři k	3,4, 5,6, 7
Rybíz, Štítenky - Při prvním výskytu štítenek. Účinný také na mšice, svilušky a puklice. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	20-30 ml / 10 l	Postři k	3,4, 5,6, 7
Ředkvička, Mšice - Při prvním výskytu mšic. Účinný také na svilušky, štítenky a puklice. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	6-12 ml / 6 l / 100 m ²	Postři k	5,6, 7,8, 9
Ředkvička, Puklice - Při prvním výskytu puklic. Účinný také na mšice, svilušky a štítenky. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	6-12 ml / 6 l / 100 m ²	Postři k	5,6, 7,8, 9
Ředkvička, Svilušky - Při prvním výskytu svilušek. Účinný také na mšice, štítenky a puklice. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	6-12 ml / 6 l / 100 m ²	Postři k	5,6, 7,8, 9

Ředkvička, Štítenky - Při prvním výskytu štítenek. Účinný také na mšice, svilušky a puklice. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	6-12 ml / 6 l / 100 m ²	Postři k	5,6, 7,8, 9
Špenát, Mšice - Při prvním výskytu mšic. Účinný také na svilušky, štítenky a puklice. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	6-12 ml / 6 l / 100 m ²	Postři k	5,6, 7,8, 9
Špenát, Puklice - Při prvním výskytu puklic. Účinný také na mšice, svilušky a štítenky. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	6-12 ml / 6 l / 100 m ²	Postři k	5,6, 7,8, 9
Špenát, Svilušky - Při prvním výskytu svilušek. Účinný také na mšice, štítenky a puklice. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	6-12 ml / 6 l / 100 m ²	Postři k	5,6, 7,8, 9
Špenát, Štítenky - Při prvním výskytu štítenek. Účinný také na mšice, svilušky a puklice. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	6-12 ml / 6 l / 100 m ²	Postři k	5,6, 7,8, 9
Zelenina, Mšice - Při prvním výskytu mšic. Účinný také na svilušky, štítenky a puklice. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	6-12 ml / 6 l / 100 m ²	Postři k	5,6, 7,8, 9
Zelenina, Puklice - Při prvním výskytu puklic. Účinný také na mšice, svilušky a štítenky. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	6-12 ml / 6 l / 100 m ²	Postři k	5,6, 7,8, 9
Zelenina, Svilušky - Při prvním výskytu svilušek. Účinný také na mšice, štítenky a puklice. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	6-12 ml / 6 l / 100 m ²	Postři k	5,6, 7,8, 9
Zelenina, Štítenky - Při prvním výskytu štítenek. Účinný také na mšice, svilušky a puklice. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	6-12 ml / 6 l / 100 m ²	Postři k	5,6, 7,8, 9
Zelí, Mšice - Při prvním výskytu mšic. Účinný také na svilušky, štítenky a puklice. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	6-12 ml / 6 l / 100 m ²	Postři k	5,6, 7,8, 9
Zelí, Puklice - Při prvním výskytu puklic. Účinný také na mšice, svilušky a štítenky. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	6-12 ml / 6 l / 100 m ²	Postři k	5,6, 7,8, 9
Zelí, Svilušky - Při prvním výskytu svilušek. Účinný také na mšice, štítenky a puklice. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	6-12 ml / 6 l / 100 m ²	Postři k	5,6, 7,8, 9
Zelí, Štítenky - Při prvním výskytu štítenek. Účinný také na mšice, svilušky a puklice. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	6-12 ml / 6 l / 100 m ²	Postři k	5,6, 7,8, 9
Tykvovitá zelenina, Mšice - Při prvním výskytu mšic. Účinný také na svilušky, štítenky a puklice. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	6-12 ml / 6 l / 100 m ²	Postři k	5,6, 7,8, 9

Tykvovitá zelenina, Puklice - Při prvním výskytu puklic. Účinný také na mšice, svilušky a štítenky. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	6-12 ml / 6 l / 100 m ²	Postřik	5,6, 7,8, 9
Tykvovitá zelenina, Svilušky - Při prvním výskytu svilušek. Účinný také na mšice, štítenky a puklice. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	6-12 ml / 6 l / 100 m ²	Postřik	5,6, 7,8, 9
Tykvovitá zelenina, Štítenky - Při prvním výskytu štítenek. Účinný také na mšice, svilušky a puklice. Na přírodní bázi. Bez OL. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci. Před aplikací ověřte citlivost na menším množství počtu rostliny.	6-12 ml / 6 l / 100 m ²	Postřik	5,6, 7,8, 9